

Informacja dla Pacjentki/Pacjenta przed znieczuleniem do zabiegu endoskopowego

- podpisaną informację należy przynieść ze sobą do szpitala

Szanowni Państwo, W najbliższym czasie planowane jest u Pani/Pana przeprowadzenie badania endoskopowego w znieczuleniu dożylnym/sedacji.

Znieczulenie to polega na podawaniu leków przeciwlękowych, przeciwbólowych i nasennych drogą dożylną. Podczas tego rodzaju znieczulenia pacjent nie odczuwa bólu, a świadomość jest okresowo ograniczona lub całkowicie wyłączona. Znieczulenie ma na celu wyłączenie bólu i lęku oraz zmniejszenie dyskomfortu związanego z zabiegiem. Podczas znieczulenia pacjent jest pod stałym nadzorem, a jego funkcje życiowe czyli praca serca, oddech, ciśnienie tętnicze i natlenienie krwi są stale monitorowane. Wszystkim pacjentom podawany jest tlen. Po zabiegu pacjent jest przewożony do sali obserwacyjnej, w której pozostaje do momentu ustąpienia działania podawanych przy znieczuleniu leków.

Za Państwa bezpieczeństwo w czasie znieczulenia będzie odpowiadał lekarz anestezjolog. Jeśli choruje Pani/Pan na jakieś choroby przewlekłe, należy przynieść ze sobą do szpitala dokumentację medyczną będącą w Państwa posiadaniu (karty informacyjne, wyniki badań). Jeśli ma Pani/Pan wszczepiony układ stymulujący serca (stymulator, kardiowerter) – ostatnia kontrola stymulatora powinna być nie więcej niż przed 6 miesiącami. Należy przynieść ze sobą do szpitala książeczkę stymulatora. Należy też przynieść ze sobą wypełnioną wcześniej szczegółowo Deklarację Aktualnego Stanu Zdrowia oraz wyniki badań zleconych przez Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Lekarz w przychodni przekaze Pani/Panu jak przygotować się do znieczulenia, jakie leki odstawić a jakie przyjąć w dniu zabiegu.

Przygotowanie do znieczulenia i zabiegu:

Aby znieczulenie i zabieg przebiegały jak najsprawniej i najbezpieczniej, wymagane jest odpowiednie przygotowanie pacjenta. **Przed znieczuleniem należy:** wyjąć protezy dentystyczne, zarówno częściowe jak i pełne, zmyć lakier z paznokci dłoni, zdjąć biżuterię, zdjąć okulary, usunąć szkła kontaktowe, aparat słuchowy (może ulec uszkodzeniu w polu elektromagnetycznym). Ponieważ palenie papierosów może spowodować podrażnienie dróg oddechowych oraz silny kaszel i, zalecane jest niepalenie tytoniu w dniu zabiegu.

W dniu zabiegu pacjent musi być na czczo. Nie wolno jeść pokarmów stałych i pić płynów mlecznych co najmniej 6 godzin, a płynów klarownych (woda niegazowana) nie pić co najmniej 4 godziny przed planowanym znieczuleniem. Leki, które należy przyjąć rano w dniu zabiegu, można popić nieznaczną ilością wody niegazowanej.

Należy mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej w drodze ze szpitala do domu a także przez 24 godziny od znieczulenia. Nie wolno kierować pojazdami mechanicznymi, obsługiwać urządzeń mechanicznych, pić alkoholu, podejmować ważnych decyzji przez 24 godziny po znieczuleniu.

Wyznaczona godzina badania może ulec przesunięciu ponieważ czas trwania zabiegów jest trudny do przewidzenia.

Datapodpis pacjenta

Informacja dla Pacjentki/Pacjenta po znieczuleniu

Imię Nazwisko

Pesel.....

Kwalifikacja ASA	I	II	III
------------------	---	----	-----

Podano leki :

Propofol - łącznie			mg w dawkach frakcjonowanych
--------------------	--	--	------------------------------

Fentanyl	mg		
----------	----	--	--

Atropina	mg		
----------	----	--	--

Inne leki

Płyn wieloelektrolitowy		ml	
-------------------------	--	----	--

Data.....Podpis lekarza

Pieczątka